



Η επίδραση των αερίων στις αποθηκευμένες γλυκές πιπεριές μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο

Η παρουσία του ακόμα και σε ελάχιστες ποσότητες επιταχύνει την υπερωρίμανση.

Διοξείδιο του άνθρακα

Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα περισσότερο από 5% ή (50.000 ppm) μπορεί να καταστρέψει τις πιπεριές δημιουργώντας σκασίματα, αποχρωματισμό και μαλάκωμα της σάρκας τους. Ειδικά δε εάν αποθηκεύονται κάτω από 10 ° C η κατάστασή τους επιδεινώνεται γρηγορότερα.

Όζον

Διασπά το αιθυλένιο, καταστρέφει μύκητες και βακτηρίδια.

Οξυγόνο

Χαμηλή συγκέντρωση μειώνει το ρυθμό της αναπνοής και τις συνέπειες της επίδρασης του αιθυλενίου.

**Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.**